

ANEXO 6. COMPATIBILIDAD DE VACUNAS

	ANTIBIÓTICOS	ANTIPALÚDICOS	BCG	CÓLERA im (inactivada)	COLERA oral (vivos)	DTP acelular	DTP y aisladas	ENCEFALITIS JAPONESA	ENCEFALITIS PRIMAVERAL	FIEBRE AMARILLA	GRIPE	HEPATITIS A
ANTIBIÓTICOS	■	■	12	Si	12	Si	Si	Si		Si	Si	Si
ANTIPALÚDICOS	■	■	Si	5	5					Si		
BCG	12	Si	■	Si			6	Si	Si	Si		
CÓLERA im (inactivada)	Si	5	Si	■	■				Si	1		Si
COLERA oral (vivos)	12	5		■	■				Si	Si		Si
DTP acelular	Si					■	■		Si		4	Si
DTP y aisladas	Si		6			■	■	Si	Si	6	4	6
ENCEFALITIS JAPONESA	Si		Si				Si	■	Si	Si		Si
ENCEFALITIS PRIMAVERAL			Si	Si	Si	Si	Si	■	Si	Si	Si	Si
FIEBRE AMARILLA	Si	Si	Si	1	Si	6	6	Si	Si	■		Si
GRIPE	Si					4	4				■	Si
HEPATITIS A	Si			Si	Si	Si	6	Si	Si	Si	Si	■
HEPATITIS B	Si		Si			Si	6		Si	Si	Si	Si
Hib	Si					7	6	Si		Si	Si	Si
MENINGOCOCO C conjugada						Si	Si		Si		Si	
MENINGOCOCO polisacárida	Si	Si					6		Si	Si	6	6
NEUMOCOCO conjugada						Si	Si		Si			
NEUMOCOCO polisacárida	Si	Si		4			6		Si		11	
PESTE				4					Si	Si		
POLIO im	Si			1		Si	Si		Si	Si	Si	Si
POLIO oral	Si		Si	9	9	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
RABIA	Si	5		Si	Si		6		Si	Si	Si	Si
ROTAVIRUS RRV tetravalente	Si					Si	Si					
RUBÉOLA	Si		Si	1		Si	6		Si	2	Si	8
SARAMPiÓN	Si	Si	Si	1		Si	6	Si	Si	2	Si	8
TÉTANOS	12	Si	6	Si		■	■		Si	Si	Si	Si
TIFOPARATÍFICA im (TAB)	Si			4			3		Si	Si	6	Si
TIFOIDEA oral (vivos)	12	5		Si	10				Si	Si		Si
TIFOIDEA polisacárida Ví (im)	Si			Si	Si	Si	6	Si	Si	6	Si	6
TRIPLE VIRICA	Si		Si	1		Si	6		Si	2	Si	8
VARICELA	12		Si	Si	Si	Si	Si	Si	2	2	Si	Si
VIRUELA	Si		Si							6		

Casilla vacía = falta de datos. Sí = compatibles sin límite de tiempo, distinta jeringa. (1) Separar 3 meses, (2) Separar 2 semanas. (4) Preferible separar 3 días debido a los efectos adversos, pero podrían asociarse. (5) Separar en distinta extremidad. (7) Menor seroconversión al Hib si se mezclan en la misma jeringa, con dudosa recomendación. (9) Controvertido; algunos autores recomiendan separar aproximadamente 1 mes. (10) Controvertido; algunos autores recomiendan separar 7 días. Para BCG sólo descrito con tuberculostático: 2 meses. (14) Dejar 6 meses (en > 6 años) o 2 semanas (en < 5 años) tras la polisacárida para dar la con-

Fuente: González Aledo A. An Esp Pediatr. 1998; 49: 107-108. Modificada.

HEPATITIS B	Hib	MENINGO, C conjugada	MENINGO, polisacárida	NEUMOCOCCO conjugada	NEUMOCOCCO polisacárida	PESTE	POLIO im	POLIO oral	RABIA	ROTAVIRUS (RRV-TV)	RUBEOLA	SARAMPION	TÉTANOS	TIFOPARATIFICA im(TAB)	TIFOIDEA oral (vivos)	TIFOIDEA polisac. Vi im	TRIPLE VIRICA	VARICELA	VIRUELA
Sí	Sí		Sí		Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	12	Sí	12	Sí	Sí	12	Sí
			Sí		Sí				5			Sí	Sí		5				
Sí								Sí		Sí	Sí	6					Sí	Sí	Sí
					4	4	1	9	Sí		1	1	Sí	4	Sí	Sí	1	Sí	Sí
								9	Sí						10	Sí		Sí	
Sí	7	Sí		Sí			Sí	Sí		Sí	Sí	Sí				Sí	Sí	Sí	
6	6	Sí	6	Sí	6		Sí	Sí	6	Sí	6	6		3		6	6	Sí	
								Sí				Sí				Sí		Sí	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí			Sí			Sí	Sí	Sí	Sí		2	2	Sí	Sí	Sí	6	2	2	6
Sí	Sí	Sí	6		11		Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	6		Sí	Sí	2	2	
Sí	Sí		6				Sí	Sí	Sí		8	8	Sí	Sí	Sí	6	8	Sí	
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí			6	Sí	Sí	Sí	
Sí		Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí		Sí	Sí	Sí			Sí	Sí	Sí	Sí	
Sí	Sí		14				Sí	Sí			Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	
Sí	Sí	14					Sí	Sí	Sí		Sí	8	Sí		6	8	Sí	Sí	
Sí	Sí				13		Sí	Sí			Sí	Sí			Sí	Sí	Sí	Sí	
Sí	Sí		Sí	13		4	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	4		4	Sí	Sí	
				4										4		Sí		Sí	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	3		6	Sí	Sí	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	3	3	Sí	Sí	Sí	
Sí			Sí		Sí		Sí	Sí			Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	6	Sí	Sí	
Sí	Sí						Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí				Sí	Sí	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	3	Sí			2	2
Sí	Sí	Sí	8	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí		Sí		3	Sí			2	2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		3		6	Sí	Sí	
					4	4	3	3	Sí				3					Sí	
								3	Sí		3	3					3	Sí	
6	Sí	Sí	6	Sí	4	Sí	6	Sí	6		Sí	Sí	6				Sí	Sí	
Sí	Sí	Sí	8	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí		Sí		3	Sí			2	2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	2	2	Sí	Sí	Sí	Sí	2		
											2	2					2		

mas. (2) Dar simultáneamente, y si no separadas 1 mes. (3) Controvertido; algunos autores recomiendan
) Separar 1 día de Tifoidea, 7 días de Cólera/Rabia o usar Rabia IM (no ID). (6) Posible asociar, pero
 repercusión práctica; se permite mezclar en la misma jeringa la DTPa y Hib del mismo laboratorio. (8)
 conversión al poliovirus tipo 1; si es posible separar 1 mes. (10) Separar 3 días. (11) Sólo en inmunode-
 y tal vez Ciprofloxacino; para Tétanos con Cloramfenicol y para Varicela con Acyclovir. (13) Separar
 jugada, y 2 semanas tras la conjugada para dar la polisacárida.